

Buddléia

Buddleja davidii




Figure : Carte de la répartition du buddléia dans la commune de Saxon. La présence de la plante est signalée par les points rouges. (Source : InfoFlora.ch, août 2024)

Risque

Population dense qui élimine localement la végétation indigène, surtout dans les zones pionnières et empêche la succession écologique.

https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_budd_dav_f.pdf

Lutte

Stade de végétation	Lutte - mesures	Lutte - saison
Plantes isolées ou jeunes	Arracher avec les racines (plusieurs fois par an)	Du printemps à fin novembre avant la maturité des graines
Arbustes plus âgés	Dessoucher	

Nombre estimé de sites annoncés sur la commune (août 24) : 18



Bunias d'Orient

Bunias orientalis



Figure : Carte de la répartition du bunias d'Orient dans la commune de Saxon. La présence de la plante est signalée par les points rouges. (Source : InfoFlora.ch, août 2024)

Risque

Propagation rapide le long des routes, des rives des cours d'eau, des prairies et des pâturages. Envahit les surfaces d'exploitation agricole ou elle n'est pas mangée par le bétail.

https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_buni_ori_f.pdf

Lutte

Stade de végétation	Lutte - mesures	Lutte - saison
Plantes isolées ou jeunes	Arracher ou déterrer	Mai-juin et juillet-août
Grandes populations	1 ^{ère} fauche	Mai-juin
	2 ^{ème} fauche	Juillet-août

Nombre estimé de sites annoncés sur la commune (août 24) : 7



Source : InfoFlora.ch

Renouées asiatiques

Renouée du Japon *Reynoutria japonica*

Renouée à épis nombreux *Polygonum polystachium*

Renouée de Sakhaline *Reynoutria sachalinensis*




Figure : Carte de la répartition des renouées asiatiques dans la commune de Saxon. La présence de la plante est signalée par les points rouges. (Source : InfoFlora.ch, août 2024)

Lutte

Stade de végétation	Lutte - mesures	Lutte - saison
Plantes isolées ou jeunes	Arracher avec les rhizomes 4-5x/an Coupe ou fauche suivie d'un traitement chimique par aspersion foliaire à répéter autant que nécessaire	Toute l'année
Grandes populations	Fauches répétées toutes les 3-4 semaines, au total 6x/an Coupe/arrachage/excavation complété d'un bachâge le long des cours d'eau	Avril-mai à octobre Coupe en juin-juillet puis traitement en août-septembre

Remarque : big bag sécurisé, faire avant les fleurs

Nombre estimé de sites annoncés sur la commune (août 24) : 15

Subventions :

Cours d'eau : demander à SDANA



Solidages nord-américains

Solidage du Canada *Solidago canadensis*

Solidage géant *Solidago gigantea*




Figure : Carte de la répartition des solidages nord-américains dans la commune de Saxon. Les sites dans lesquels la plante a été ou est présente sont signalés respectivement par les points verts et rouges. (Source : InfoFlora.ch, août 2024)

Lutte

Stade de végétation	Lutte - mesures	Lutte - saison
Plantes isolées ou jeunes	Arracher avec les rhizomes 2-3x/an	Mai-juin à août-septembre
Grandes populations	Faucher et arracher en périphérie de la surface envahie	1 ^{ère} fauche : juin 2 ^{ème} fauche : mi-août

Nombre estimé de sites annoncés sur la commune (août 24) : 17



Source : InfoFlora.ch

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens

Source : InfoFlora.ch




Figure : Carte de la répartition du séneçon du Cap dans la commune de Saxon. Les sites dans lesquels la plante est présente sont signalés par les points et les carrés rouges. Les carrés verts indiquent que la plante a été éradiquée dans la zone. (Source : InfoFlora.ch, août 2024)

Lutte

Stade de végétation	Lutte - mesures	Lutte - saison
Plantes isolées ou jeunes	Arracher 3-5x/an avec les racines	Mai à novembre
Grandes populations	Faucher à ras et arracher en périphérie de la zone	

Nombre estimé de sites annoncés sur la commune (août 24) : > 20

Subventions :

- Gestion prise en charge par le SFNP



Source : InfoFlora.ch